

- Старовир И. С. Функциональная гистология процесса пищеварения клещей *Amblyseius reductus* (Parasitiformes, Phytoseiidae).— Там же, 1982, № 1, с. 69—74.
- Старовир И. С., Барабанова В. В. Способность клещей фитосейид *Phytoseiulus persimilis*, *Amblyseius andersoni* и *A. reductus* гидролизовать некоторые пищевые субстраты.— Там же, 1981, № 1, с. 77—79.
- Сугоняев Е. С. Опыт разработки интегрированной системы защиты хлопчатника от вредителей на биоценологической основе.— Журн. общ. биол., 1979, № 5, с. 668—676.
- Сугоняев Е. С., Сорокина А. П. Систематика рода трихограмма.— Защита растений, 1975, № 6, с. 33—35.
- Тобиас В. И. Значение систематики для интегрированных методов защиты растений.— В кн.: Биологические средства защиты растений. М.: Колос, 1974, с. 41—60.
- Толканіс В. І. Іхневмоніди-фітодіетини.— К.: Наук. думка, 1981, — 148 с. — (Фауна України; Т. 2. Вип. 1).
- Тряпичев В. Н. Возможности интродукции в СССР паразитических хальцид (Hymenoptera, Chalcidoidea) — естественных врагов вредителей сельскохозяйственных культур.— Энтомол. обозрение, 1981, 60, № 3, с. 484—493.
- Щепетильникова В. А., Федоринчик Н. С., Колмакова В. Д., Капустина О. В. Комплекс приемов биологической борьбы как основа системы защиты плодового сада от вредителей в зоне с одним поколением яблонной плодожорки.— Тр. Всесоюз. ин-та защиты растений, 1968, вып. 31, с. 21—62.
- Яснош В. А. Значение биосистематического изучения для таксономии и практического применения афелинид (Chalcidoidea, Aphelinidae).— Зоол. журн., 1973, 52, вып. 3, с. 1193—1201.
- De Bach P. Biological control of insects pests and weeds.— New York, etc., 1964.— 844 p.
- Force D. C. Genetics in the colonisation of natural enemies for biological control.— Ann. Entomol. Soc. Am., 1967, 60, p. 722—729.
- Kerrich G. Y. The state of our knowledge of the systematics of the Hymenoptera Parasitica.— Trans. Soc. Brit. Ent., 1960, 14, N 1, p. 1—18.
- Lloyd D. C. The significance of the type of host plant crop in successful biological control of insect pests.— Nature, 1960, N 187, p. 430—431.
- Noyes J. S. On the numbers of genera and species of Chalcidoidea (Hymenoptera) in the world.— Entomol. gaz., 1978, 29, p. 163—164.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена
АН УССР

ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

УДК 595.793 (571.645)

Новый для фауны СССР вид булавоусых пилильщиков-цимбицид (Hymenoptera, Cimbicidae) — *Orientabia dubiosa* Gussakovskij с Курильских островов.— Палеарктоарктический род *Orientabia* Malaise включает 10 видов, из числа которых 4 зарегистрированы в СССР — на Дальнем Востоке (Гуссаковский, 1947). Этот же автор описал в 1947 г. по самке из Японии (без более точного указания местонахождения типового экземпляра) вид *O. dubiosa* Guss. Мною 1 ♀ этого вида поймана на тихоокеанском побережье юго-восточной оконечности о-ва Итуруп (в районе мыса Рикорда) 18.VII 1965 г. на прибрежных куртинах цветущего морщинистого шиповника (*Rosa rugosa* Thunb.). В качестве кормового растения личинок двух видов этого рода известна вейгела — *Weigela Thunb.* (Okutani, 1967). Вид является субэндемиком южных Курил и Японии.— В. М. Ермоленко (Киев, Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР).

Об изменении родового названия трагоцеруса из Новой Эметовки — Костев овраг, Одесской обл. Родовое название *Neotragocerus*, присвоенное мезотическому трагоцерусу из Новой Эметовки — Костев овраг Одесской обл. (Короткевич, 1981), следует заменить на *Mesotragocerus* (от лат. слова *meso* — средний). Ранее род *Neotragocerus* Matthew, Cook, 1909 (подсемейство Caprinae Gill, триба Rupicaprini Simpson) был отмечен в плейстоцене Северной Америки (Simpson, 1945).— Е. Л. Короткевич (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР).